

# VOEDERERWTEN



JAN  
FEB  
MRT  
APR  
MEI  
JUN  
JUL  
AUG  
SEPT  
OKT  
NOV  
DEC

## KENMERKEN

- ▶ Eenjarig gewas
- ▶ Vlinderbloemige: geen stikstofbemesting nodig
- ▶ Opletten voor sclerotinia en botrytis, de erwtenpeulboorder, echte en valse meeldauw
- ▶ Ook legering en pikschade door duiven vormen een risico

## MENGTEELT GRAAN-VOEDERERWTEN

- ▶ Combinatie gerst-erwten is mogelijk
- ▶ Mengteelt beter beschermd tegen legering, afhankelijk van de groeiwijze van de erwten
- ▶ Gerst helpt pikschade door volgens te beperken
- ▶ Minder open plekken in het gewas
- ▶ Weinig toegelaten gewasbeschermingsmiddelen
- ▶ Mogelijk lichte verschillen op gezamenlijke afrijping

## WORDT GEBRUIKT ALS VEEVOEDER

- ▶ Rijk aan eiwit (onbestendig voor herkauwers)
- ▶ Voor rundvee, varkens en pluimvee
- ▶ Deegrijp of droog dorsen
- ▶ Deegrijp: pletten of malen tot worst voor bewaring

## AREAAL IN VLAANDEREN

- ▶ 80-90 ha



Vlaanderen  
is landbouw

**ILVO**  
Instituut voor Landbouw-,  
Visserij- en Voedingsonderzoek