



Aandachtspunten conserveringslandbouw in BIO (ABC)

Veel aandacht wijze van inpassen eenjarige gewassen in de rotatie

TWEE soorten gewasrotaties

1. Een rotatie met tijdelijk grasland op basis van grassen en vlinderbloemigen en inlassen van BIOMAX* groenbedekkers
2. Een permanente groenbedekker op basis van dwergklaver en BIOMAX

Het tijdelijk grasland op basis van grassen en vlinderbloemigen

- ✓ bedekkingsgraad van ongeveer 80% rode klaver en luzerne in de zomer
- ✓ Minstens 40-50% tijdelijk grasland in de rotatie
- ✓ Indien < 40-50% tijdelijk grasland -> NOOD aan eenjarige vlinderbloemige zaadteelten (bv. veldbonen) en meer BIOMAX op basis van vlinderbloemigen in de rotatie OF overgaan naar een systeem van permanente groenbedekker

BIOMAX groenbedekkersmengsel

- ✓ samengesteld uit minstens vier plantenfamilies
- ✓ rijk aan vlinderbloemige soorten
- ✓ minstens 2 jaar in een 5- à 7-jarige rotatie = 30 - 40% BIOMAX in de gewasrotatie

BIJKOMENDE UITGANGSPUNTEN

- ✓ Elk jaar een vlinderbloemige component op elk van de percelen = 100% vlinderbloemige teelt in de rotatie (tijdelijk grasland, BIOMAX, permanente groenbedekker met vlinderbloemige component, vlinderbloemige zaadteelt als hoofdgewas)
- ✓ Vermijd meer dan 50% zomerteelten (eenjarige teelten) in de gewasrotatie
- ✓ Tijdelijk grasland niet langer dan 2 jaar aanhouden
- ✓ Snelle installatie van BIOMAX na de oogst van de hoofdteelt, zelfs vóór de oogst

Demodag Agro-ecologisch Proefplatform Hansbeke 2023



Vlaanderen
is landbouw & visserij

